


FOLFIRIの治療をお受けになる方へ



腫瘍は、正常細胞に比べて分裂増殖が盛んです。
 FOLFIRIは、分裂増殖が盛んな細胞に作用します。
 正常細胞でも分裂増殖が盛んな細胞は、薬の影響を受けやすく副作用として現れてきます。
 以下に、FOLFIRIによる治療の副作用をご説明しますがこれらの副作用がすべての方に必ず起こるわけではありません。

薬の名前	1日目	2日目	3~14日	15日目	16日目	17~28日
デキサート・グラニセロン 15分			お休み			
①イリノテカン;2時間 (成分名;イリノテカン)						
②レボホリナート;2時間 (成分名;レボホリナート)						
フルオロウラシル;急速静注 (成分名;フルオロウラシル)						
フルオロウラシル;46時間点滴 (成分名;フルオロウラシル)						

①と②は同時に点滴します。

◎副作用について

●食欲不振・吐き気

程度の差はありますが、ほとんどの方に認められる症状です。
点滴治療の場合には点滴終了後3日程度と言われていた
症状が強い場合は時期に合わせて、吐き気止めのお薬を追加することがあります。

●疲労感

身体がだるく感じたり、疲れやすさを感じる場合があります。多くは点滴後3日間程度と言われて
います。この期間は無理をせず休息をとるほか、散歩など気分転換をはかるとよいと言われて
います。

●骨髄抑制

白血球が少なくなると、病原菌に対する体の抵抗力が弱くなり、感染症を起こしやすくなります。
そのため、手洗い・うがいを心がけましょう。

特に治療期間中38.0度以上の発熱、37度台であっても悪寒や咳、のどの痛み、排尿時の痛みな
どがある場合は感染症にかかっている場合があるので病院へ連絡しましょう。

赤血球が減少することで貧血になる場合があります。

血小板は止血に働くため減少が強いと出血しやすくなります。歯茎からの出血や鼻血の症状に
注意が必要です。

●下痢・便秘

1日3回以上の排便回数の増加や水様便が出る場合があります。

症状が続く場合は、脱水症状を防ぐため水分補給を行ってください。

症状に合わせて下痢止めを使うことがあります。

また、便秘になる場合もあるので便秘の場合は下剤を使用することがありま

●口内炎

口の中・歯肉・咽頭がしみる、ひりひりする、赤くなるといった症状が出る場合があります。

口内炎は予防がもっとも大切です。口の中を清潔に保つよう心がけましょう！！

●血管痛・静脈炎、注射部位熱感・局所痛

薬が血管を刺激するため、治療中に血管の痛みや腫れが起こることがあります。また、数日後
にも発赤、腫脹、熱感などを感じる場合があります。異常を感じたらすぐにお知らせください。

●間質性肺炎

息切れ、呼吸苦、せき及び発熱の症状が続く場合は早めに相談しましょう。

●イリノテカンの下痢

(1)早期性の下痢

抗がん剤により自律神経(副交感神経)が刺激を受け、腸の動きが活発になっておこる下痢です。抗がん剤を投与してから数時間以内におこることがあります

(2)遅発性の下痢(腸管粘膜障害による下痢)

抗がん剤によって腸が刺激を受け、腸の粘膜が傷ついておこる下痢です。この種類の下痢がおこった場合、腸が傷つくために感染症を引き起こすこともあり注意が必要です。抗がん剤を投与してから数日～10日後頃におこることがあります



これら以外の副作用があらわれる場合もありますので、
気になる症状があらわれた際には必ず医師、薬剤師または
看護師にご相談ください。

担当薬剤師