





GC(ゲムシタビン・カルボプラチン)の治療をお受けになる方






腫瘍は、正常細胞に比べて分裂増殖が盛んです。
 ジェムザールとカルボプラチンは、分裂増殖が盛んな細胞に作用します。
 正常細胞でも分裂増殖が盛んな細胞は、薬の影響を受けやすく副作用として現れてきます。
 以下に、ジェムザールとランダによる治療の副作用をご説明しますがこれらの副作用がすべての方に必ず起こるわけではありません。

薬の名前	1日目	2日目	8日目	15日目	16~28日
ジェムザール (成分名;塩酸ゲムシタビン)		お休み			お休み
カルボプラチン	お休み		お休み	お休み	お休み

※この治療は、通常4週間を1コースとしています。
 ※症状や経過に合わせてお休み期間は変わります。

一日目のスケジュール

	点滴時間	薬の名前	薬の働き
		ソリューゲンG500ml プリンペラン	プリンペラン;吐き気を抑える。
	15分	生理食塩水100ml グラニセトロン、デキサート	デキサート、グラニセトロン;吐き気を抑える。
	30分	5%ブドウ糖100ml ゲムシタビン	ゲムシタビン;腫瘍の細胞分裂を抑える。

二日目のスケジュール

		ソルデム3A	ソルデム3A:水分補給
	15分	生理食塩水100ml グラニセトロン、デキサート	デキサート、グラニセトロン;吐き気を抑える。
	120分	生理食塩水500ml カルボプラチン	カルボプラチン;腫瘍の細胞分裂を抑える。

◎起こりやすい副作用について ジェムザール・カルボプラチンによる副作用

●食欲不振・吐き気

程度の差はありますが、ほとんどの方に認められる症状です。
点滴治療の場合には点滴終了後3日程度と言われております
症状が強い場合は時期に合わせて、吐き気止めのお薬を追加することがあります。

●疲労感

身体がだるく感じたり、疲れやすさを感じる場合があります。多くは点滴後3日間程度と言わ

●骨髄抑制

白血球が少なくなると、病原菌に対する体の抵抗力が弱くなり、感染症を起こしやすくなり
特に治療期間中38.0度以上の発熱、37度台であっても悪寒や咳、のどの痛み、排尿時の
赤血球が減少することで貧血になる場合があります。

血小板は止血に働くため減少が強いと出血しやすくなります。歯茎からの出血や鼻血の

●下痢・便秘

1日3回以上の排便回数の増加や水様便が出る場合があります。
症状が続く場合は、脱水症状を防ぐため水分補給を行ってください。
症状に合わせて下痢止めを使うことがあります。

また、便秘になる場合もあるので便秘の場合は下剤を使用することがあります。

●口内炎

口の中・歯肉・咽頭がしみる、ひりひりする、赤くなるといった症状が出る場合があります。
口内炎は予防がもっとも大切です。口の中を清潔に保つよう心がけましょう！！

●味覚障害

味覚障害は、甘味、塩味、酸味、苦味、旨味の5つの基本味の変化に対する症状であり、

●血管痛・静脈炎、注射部位熱感・局所痛

薬が血管を刺激するため、治療中に血管の痛みや腫れが起こることがあります。また、数
日後にも発赤、腫脹、熱感などを感じる場合があります。異常を感じたらすぐにお知らせく
ださい。点滴の種類によっては点滴する腕を温めて点滴をします。

●脱毛

この治療は脱毛の頻度がやや高いと言われております。毛が抜けやすくなる、髪を洗ったと
きに多量の毛髪が抜けるといったことがあります。個人差はありますが、薬の投与2～3週
間後から多く起こります。髪は、抗がん剤の治療が終われば3～6ヶ月後には再び生えて
くる場合が多いです。

●間質性肺炎

息切れ、呼吸苦、せき及び発熱の症状が続く場合は早めに相談しましょう。



これら以外の副作用があらわれる場合もありますので、気になる症状があら
看護師にご相談ください。

担当薬剤師

--